

FICHE TECHNIQUE BIOMASEPTOL GHA

**GEL HYDROALCOOLIQUE DESINFECTANT POUR POUR FRICTION HYDROALCOOLIQUE
TRAITEMENT HYGIENIQUE ET LA DESINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS ET AVANT BRAS
PROPRES ET SAINES PAR FRICTION POUR LA PREVENTION DES RISQUES DES INFECTIONS ASSOCIEES
AUX SOINS**

Application facile, Action immédiate et séchage est rapide

Biocides destinés à l'hygiène humaine (Groupe 1 – TP1)

(Bactericide – Fongicide/levuricide – Virucide)



PROPRIETES

BIOMASEPTOL GHA gel hydro alcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains et avant bras par friction sans eau.

Il s'utilise sur des mains saines propres et sèches et sans rinçage ou essuyage avec un temps de friction de 30 secondes minimum, il est destiné pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains et avant bras saines en milieu hospitalier.

BIOMASEPTOL GHA gel hydro alcoolique est Hypoallergénique,

Ne dessèche pas les mains,

Contient des agents hydratants émollients et adoucissants qui maintiennent l'équilibre hydrolipidique de la peau.

COMPOSITION

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 700 mg/g, soit 755 ml/l), agents gélifiants, agents hydratant et émollient, Eau.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Traitement hygiénique : EN 13727, EN 13624, pendants 30 secondes.

Traitement Chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791 pendants 90 secondes

Bactéricide selon : EN1040, EN 13727

Levures/Moisissures selon : EN 1275 et EN 1650 en 30 sec.

Virucide : EN 14476 en 30 sec.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Aspect** : gel
- **Couleur** : incolore
- **Odeur** : caractéristique éthanol
- **Densité** (α 20°C): 0.855 +/- 0.005
- **Viscosité** (α 20°C) : 1500 à 3000 cp
- **pH produit pur** : 5 à 5.5
- **Matière active** : Ethanol 76% (v/v)



AntiBacterial

BIOMASEPTOL GHA

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

INDICATIONS MAJEURES

- **Avant tout contact avec le patient** : Pour le protéger de la flore cutanée du soignant.
- **Avant un soin aseptique** : (Ex: pose de cathéter, pansement, injection). Pour éviter l'introduction de germes dans le corps du patient.
- **Après un risque d'exposition à un liquide biologique** : (Même si on portait des gants). Pour se protéger et protéger l'environnement.
- **Après tout contact avec le patient** : Pour protéger le soignant et les patients suivants.
- **Après contact avec l'environnement immédiat du patient** : (Ex: lit, table de chevet, moniteur). Le matériel peut être contaminé.

SITUATIONS SPECIFIQUES

- **Lors de l'enchaînement de soins** : Entre deux sites différents sur le même patient (passer d'un soin sale à un soin propre).
- **Avant de mettre et après avoir retiré des gants** : Les gants ne remplacent pas la désinfection ; ils peuvent être poreux ou se contaminer lors du retrait.
- **Avant de manipuler des dispositifs médicaux** : Même propres ou stériles.

CONTRE-INDICATIONS

Dans les cas suivants, un **lavage simple à l'eau et au savon doux** est obligatoire :

- **Mains visiblement souillées** : (Sang, pus, liquides biologiques). Le gel est inactivé par les matières organiques.
- **Mains mouillées ou humides** : L'eau dilue l'alcool et diminue son efficacité.
- **Mains poudrées** : Résidus de gants.
- **Contact avec un patient infecté par des spores** : (Ex: *Clostridium difficile*). Le gel hydro-alcoolique n'est pas sporicide ; seule l'action mécanique du lavage à l'eau élimine les spores



MODE D'EMPLOI

Friction hygiénique

1. Appliquer 3 ml sur mains propres et sèches.
2. Frictionner les mains et les avant-bras pendant 30 sec.
3. Maintenir les mains humides pendant 30 secondes, Ne pas rincer. Ne pas sécher.

Friction chirurgicale

1. Appliquer 4,5 ml sur mains et avant bras propres et sèches.
 2. Frictionner les mains et les avant-bras, coudes inclus, pendant 1 minute.
 3. Réaliser une seconde friction avec 4,5 ml pendant 1 min, coudes exclus.
- Pour une activité sur *Clostridium difficile* et Rotavirus : frictionner pendant 5 minutes, avec une ou plusieurs doses de gel afin que la peau reste humide pendant ces 5 minutes

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux

- Respectez les précautions d'emploi
- Utilisez les biocides avec précaution.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette, fiche technique et FDS
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler.
- Ne pas mettre en contact avec les yeux ou les muqueuses.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée.
- Eliminer le contenu/récipient dans un conteneur à déchets



BIOMASEPTOL GHA

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim – Fès - Tél. : (212)35 96 04 59
E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

CONDITIONS DE STOCKAGE ET CONSERVATION

- Produit à stocker dans son emballage d'origine fermé entre +5°C et +30°C
- Durée de conservation : 24 mois pour un flacon fermé.
- PAO (Période Après Ouverture) : Environ 6 mois après ouverture du flacon

CONDITIONNEMENT

Flacon 1 litre en PET avec doseur réf : GAA01-75

Bidon 5 litres en PEHD SHA01-88, réf : GAA02-75

Bidon 20 litres en PEHD réf : GAA03-75



AntiBacterial

BIOMASEPTOL GHA

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59
E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com